

Vinova loza

Zaštitna sredstva i programi zaštite

BAYER

Fungicid

NATIVO®

BAYER

Sistemični fungicid za suzbijanje pepelnice vinove loze.

Djelovanje
kontaktno, sistemično, preventivno, kurativno

Aktivna tvar
tebukonazol (500 g/kg), trifloksistrobin (250 g/kg)

Formulacija
WG – močive samodispergirajuće granule

Doza primjene
vinova loza: 0,2 kg/ha

Pakiranje
20 g, 200 g, 1 kg

- Zaštita vinove loze od pepelnice 12–14 dana.
- Odlično kurativno djelovanje.
- Dobro sporedno djelovanje na sivu plijesan.
- Nativo® zbog dugotrajne učinkovitosti preporučujemo kombinirati s pripravcima protiv plamenjače Mikal® premium F ili Profiler®.
- Nativo® se može miješati sa proizvodima na bazi sumpora.

Fungicid

PROSPER®

Fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu.

Djelovanje
kontaktno, sistemično, preventivno, kurativno

Aktivna tvar
Spiroksamin (300 g/l)

Formulacija
CS - inkapsulirana suspenzija

Doza primjene
vinova loza: 1 l/ha

Pakiranje
1 L, 250 mL

// Visoka efikasnost protiv pepelnice.
// Izuzetna sistemičnost i efikasnost pri visokim teperaturama.
// Fleksibilan u uporabi.
// Efikasan i siguran.
// Maksimalan broj tretmana u toku godine je 2.
// Odlična pokrovnost i oslobađanje aktivne tvari na površini lista.
// Za produljeno djelovanje dodati Folicur® 0,1 l/ha ili sumporni pripravak (prema preporuci proizvođača).

Biološki proizvod

SERENADE® ASO

BAYER

Serenade ASO je biološki fungicid i baktericid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, povrćarstvu i ratarstvu.

Djelovanje
biološko, kontaktno, preventivno

Aktivna tvar
Bacillus amyloliquefaciens (14,1 g/L)

Formulacija
SC - koncentrat za suspenziju

Doza primjene
vinova loza: 4 l/ha

Pakiranje
1 L

// Biološki preparat.
// Efikasan i siguran.
// Suzbija sivu plijesan (*Botrytis cinerea*).
// Sredstvo se primjenjuje preventivno, u razdoblju kada postoje povoljni uvjeti za razvoj bolesti od faze vidljivo odvojenih cvjetnih pupova do berbe.
// Dozvoljene su najviše 4 primjene tijekom vegetacije.
// Za optimalnu učinkovitost osigurati kvalitetnu aplikaciju i dobru pokrovnost grozdova.

Biološki proizvod

FLiPPER®

BAYER

Kontaktni insekticid i akaricid namijenjen suzbijanju lisnih uši, štitastih uši, grinja, štitastih moljaca i tripsa u ratarstvu, voćarstvu, povrćarstvu i hortikulturi.

Djelovanje
kontaktno

Aktivna tvar
masne kiseline kalijeve soli, 479,8 g/L

Formulacija
Emulzija, ulje u vodi (EW)

Doza primjene
vinova loza: 3-10 L/ha

Pakiranje
5 L

// Biološki kontaktni insekticid i akaricid pogodan za primjenu u ekološkoj proizvodnji.
// Siguran za oprašivače i ostale korisne kukce.
// Bez karence.
// Široka registracija na voću i povrću.
// Idealan partner konvencionalnim insekticidima u programima integrirane zaštite.
// Aktivna tvar prodire ispod kutikule štetnika koji se prestaje hraniti, guši se i brzo ugiba.

Fungicid

Luna® EXPERIENCE

BAYER

Kombinirani fungicid jedinstvenog načina djelovanja namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i povrćarstvu.

Djelovanje
sistemično, preventivno, kurativno

Aktivna tvar
fluopiram (200 g/l), tebukonazol (200 g/l)

Formulacija
SC - koncentrirana suspenzija

Doza primjene
vinova loza: 0,375 l/ha

Pakiranje
100 mL i 1 L

// Izvanredna učinkovitost i najširi spektar djelovanja.
// Sistemično djelovanje jamči učinkovitu zaštitu biljnih dijelova koji nisu bili neposredno tretirani.
// Vrhunska zaštita koja dugoročno poboljšava zdravlje tretirane biljke i plodova pri skladištenju.
// Za uspješnu pripremu pripravka za tretiranje važno je poštivati redoslijed miješanja formulacija. Naše preporuke su: 1. SL, 2. SC, KS, FL, 3. WP, 4. WG, DF, 5. SE, 6. EC, 7.EW, 8.OD, 9. Okvašivači, 10. Folijarna gnojiva.
// Pouzdan partner Mikal® Premiumu za suzbijanje pepelnice na vinovoj lozi.

Fungicid

Mikal® FLASH

Sistemični i kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinovoj lozi.

Djelovanje
kontaktno, sistemično, preventivno

Aktivna tvar
fosetil-Al (500 g/kg), folpet (250 g/kg)

Formulacija
WG – močive samodispergirajuće granule

Doza primjene
vinova loza: 3-4 kg/ha

Pakiranje
250 g, 1 kg

// Usvaja se u biljku već 30 minuta nakon primjene i kiša ga ne može isprati.
// Aktivna tvar je 1 sat nakon primjene aktivno raspoređena po cijeloj biljci.
// Povećava prirodnu otpornost biljke.
// Mikal® Flash primjenjujemo na zdravoj lozi. Ako smo opazili prve simptome bolesti, umjesto pripravka Mikal® Flash preporučujemo primjenu Mikal® Premium F koji posjeduje kurativno djelovanje.

Fungicid

Mikal®
premium F

Sistemični i kontaktni fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze.

Djelovanje
kontaktno, sistemično, preventivno, kurativno

Aktivna tvar
fosetil-Al (500 g/kg), folpet (250 g/kg), iprovalikarb (40 g/kg)

Formulacija
WG – močive samodispergirajuće granule

Doza primjene
vinova loza: 3 kg/ha

Pakiranje
200 g i 1 kg

// Fungicid s najboljim preventivnim i kurativnim djelovanjem.
// Fungicid koji osigurava najduži razmak između dva tretiranja.
// Povećava prirodnu otpornost biljke.
// Zbog posebnog načina djelovanja Mikal® premium F se preporučuje koristiti u bloku i to od početka cvatnje, završetka cvatnje i nakon cvatnje. Razmak između tretiranja treba biti 12–14 dana.
// U slučaju pojave simptoma plamenjače preporučujemo primjenu preparata Mikal® premium F zbog njegovog kurativnog djelovanja.

Fungicid

PROFILER®

Kombinirani preventivni fungicid koji se koristi za suzbijanje plamenjače vinove loze.

Djelovanje
kontaktno, sistemično, preventivno

Aktivna tvar
fosetil-Al (666,7 g/kg), fluopikolid (44,4 g/kg)

Formulacija
WG – močive samodispergirajuće granule

Doza primjene
vinova loza: 2,5–3 kg/ha

Pakiranje
250 g, 1 kg

// Iznimno dobro štiti grozdiće i listove.
// Dugotrajno djelovanje - omogućuje razmak između tretiranja od 12–14 dana.
// Kratka karenca.
// Neizostavan alat u borbi protiv rezistentnosti.
// Povećava prirodnu otpornost biljke.
// Miješanje s pripravkom Luna® Experience nije preporučljivo.

Fungicid

TELDOR®

Specifični botriticid izvrsnog djelovanja na sivu plijesan vinove loze.

Djelovanje
kontaktno, preventivno

Aktivna tvar
fenheksamid (500 g/l)

Formulacija
SC – koncentrirana suspenzija

Doza primjene
vinova loza: 1–1,5 l/ha

Pakiranje
100 mL, 1 L

// Efikasan i siguran.
// Postojan i dugotrajan.
// Registriran za veliki broj kultura.
// Kratke karence bez štetnog utjecaja u proizvodnji vina.
// Bez mogućnosti pojave unakrsne rezistentnosti.
// Tretiranje pripravkom Teldor® odmah nakon cvatnje te prije zatvaranja grozdova ključno je za uspješno suzbijanje sive plijesni.
// Za sprječavanje pojave sive plijesni dovoljno je tretiranje samo u zoni grozdova.

Insekticid

SIVANTO prime

BAYER

Sistemični insekticid za suzbijanje američkog cvrčka u vinogradu.

Djelovanje
kontaktno, sistemično

Aktivna tvar
flupiradifuron (200 g/l)

Formulacija
SL - koncentrat za otopinu

Doza primjene
vinova loza: 0,5 l/ha

Pakiranje
100 mL, 1 L

// Novi standard u kontroli američkog cvrčka (vektor fitoplazme vinove loze).
// Nova aktivna tvar flupiradifuron osigurava najviši sigurnosni standard – ekološki prihvatljiv i učinkovit protiv štetnih insekata.
// Prilagodljivo vrijeme uporabe.
// Pripravak nije opasan za pčele.
// Kod suzbijanja američkog cvrčka sredstvo treba primijeniti na temelju monitoringa kod pojave ličinki L1-L2 stadija.

Insekticid

SIVANTO® energy

BAYER

Kontaktno sistemični insekticid za suzbijanje štetnika u vinogradu.

NOVO

Djelovanje
kontaktno, sistemično

Aktivna tvar
flupiradifuron (75 g/l),
deltametrin (10 g/l)

Formulacija
EC – tekući koncentrat za emulziju

Doza primjene
vinova loza: 0,4 L/ha

Pakiranje
10 mL, 50 mL, 1 L

// 2 aktivne tvari s 2 različita mehanizma djelovanja – kombinacija snažnog kontaktnog i sistemičnog djelovanja.
// Neizostavan alat u borbi protiv rezistentnosti.
// Može se kombinirati s fungicidima iz Bayerove palete proizvoda.

Insekticid

Decis

Cjenovno prihvatljiv insekticid za odlično suzbijanje insekata na voćkama, vinovoj lozi, žitaricama, uljanoj repici i krumpiru.

Djelovanje
kontaktno

Aktivna tvar
deltametrin (100 g/l)

Formulacija
EC - tekući koncentrat za emulziju

Doza primjene
vinova loza: 0,125–0,175 l/ha

Pakiranje
10 mL, 50 mL, 250 mL, 1 L

// Cjenovno prihvatljiv insekticid.
// Suzbija širok spektar insekata.
// Iznimno brzo djelovanje.
// Decis® 100 EC ne smije se koristiti pri visokim temperaturama (iznad 28 °C), jer je vrlo hlapljiv.
// Pripravak je opasan za pčele! Tretiranje treba izbjegavati u vrijeme cvatnje kultiviranih biljaka i niskog raslinja. Kako bi se zaštitile pčele i ostali oprašivači tretiranje je potrebno obaviti 2 sata nakon zalaska ili 2 sata prije izlaska sunca.

Program zaštite *vinove loze*



	Bubrenje pupa	3-4 lista	Mladice 8-12 cm	Mladice 30-50 cm	Neposredno prije cvatnje	Nakon cvatnje	Rast boba	Zatvaranja grozda	Dozrijevanje
plamenjača vinove loze		kontaktni pripravci po potrebi	Mikal FLASH 3-4 kg/ha	PROFILER* 2,5–3 kg/ha	Mikal premium F 3 kg/ha	Mikal premium F 3 kg/ha	Mikal premium F 3 kg/ha ili PROFILER* 2,5-3 kg/ha	PROFILER* 2,5–3 kg/ha	kontaktni pripravci po potrebi
crna pjegavost	registriran kontaktni pripravak								
pepelnica	sumporni pripravci	sumporni pripravci	NATIVO 0,2 kg/ha	PROSPER 1 l/ha	Luna EXPERIENCE 0,375 l/ha	Luna EXPERIENCE 0,375 l/ha	PROSPER 1 l/ha	NATIVO 0,2 kg/ha	
siva plijesan						TELDOR* 1–1,5 l/ha ili SERENADE ASO 4 l/ha		TELDOR* 1–1,5 l/ha ili SERENADE ASO 4 l/ha	TELDOR* 1–1,5 l/ha ili SERENADE ASO 4 l/ha
štitaste uši						FLiPPER 3–10 l/ha	FLiPPER 3–10 l/ha		
grinje	sumporni pripravci								
grožđani moljci								decis 100 EC 0,125–0,175 L/ha	
američki cvrčak						SIVANTO prime 0,5 l/ha ili FLiPPER 3–10 l/ha	SIVANTO energy 0,4 l/ha ili FLiPPER 3–10 l/ha	SIVANTO energy 0,4 l/ha ili FLiPPER 3–10 l/ha	FLiPPER 3–10 l/ha
biostimulatori			Ambition AKTIVATOR 2 l/ha	Ambition AKTIVATOR 2 l/ha	Ambition AKTIVATOR 2 l/ha	Ambition AKTIVATOR 2 l/ha	Ambition AKTIVATOR 2 l/ha	Ambition ALGAE 1-2 l/ha	Ambition ALGAE 1-2 l/ha

* Profiler® je moguće primjeniti maksimalno 3 puta u vegetaciji. Ukoliko se u vegetaciji protiv pepelnice koristi Luna® Experience 2 puta, uporaba Profilera nije dozvoljena. Ukoliko se Luna® Experience primjeni jednom u vegetaciji moguće je primjeniti Profiler® maksimalno jedan put. Miješanje Profilera® s Lunom Experience ne preporučujemo. Teldor® je moguće primjeniti maksimalno 2 puta u vegetaciji.

www.cropscience.bayer.hr
agro.info@bayer.com

Katalog je informativnog karaktera, može sadržavati tiskarske pogreške. Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja na siguran način. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.

Biostimulator

Ambition® AKTIVATOR

Biostimulator koji optimizira fiziologiju i ishranu loze te smanjuje utjecaj stresa iz okoline.

Djelovanje
hranjivi pospješivač rasta

Sadrži
aminokiseline, fulvinske kiseline, cink, mangan, bor

Formulacija
tekućina

Doza primjene
vinova loza: 2 l/ha

Pakiranje
5 L

- Smanjuje deformiranost pupoljaka i omogućava ravnomjerno bubrenje.
- Izdužuje peteljku kod sorti koje imaju zbijen grozd što smanjuje potencijal za razvoj botrytisa.
- Osigurava esencijalne mikroelemente za poboljšanje cvatnje i ravnomjernije zametanje bobica.
- Primjenom u kombinaciji sa SZB značajno poboljšava njihovu učinkovitost (posebno sa Serenade Aso i Flipperom).
- Aktivira obrambeni mehanizam enzima protiv oksidativnog stresa.

Biostimulator

Ambition® ALGAE

Biostimulator od ekstrakta algi koji omogućava snažniji razvoj i jači metabolizam loze.

Djelovanje
biljni biostimulator

Sadrži
ekstrakt makroalgi

Formulacija
tekućina

Doza primjene
vinova loza 1-2 l/ha

Pakiranje
5 L

- Povećava fotosintezu i osigurava više energije za rast i razvoj (veći grozdovi).
- Poboljšava kvalitativna svojstva poput sadržaja šećera.
- Biološki aktivne komponente u formulaciji pomažu u stresnim uvjetima i pospješuju ishranu biljke.

Prodajni predstavnik





Dean Crnošija
+385 98 419 229 // dean.crnosija@bayer.com

Poslovni partner na terenu





Petar Živković
+385 98 256 924 // petarzivkovic2860@gmail.com

IZDAO:
Bayer d.o.o.
Radnička cesta 80
Zagreb
Siječanj 2026.
www.cropscience.bayer.hr